


第一节 三角公式

1、定义：点 $P(x, y)$ 是角 α 的终边上的任意一点， $|OP|=r$ ，则

$$\sin \alpha = \frac{y}{r}, \cos \alpha = \frac{x}{r}, \tan \alpha = \frac{y}{x}, \cot \alpha = \frac{x}{y}, \sec \alpha = \frac{r}{x}, \csc \alpha = \frac{r}{y}$$



当 $r=1$ 时 $\sin \alpha = y, \cos \alpha = x$

2、同角公式

(1) 倒数关系 $\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}, \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}, \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$

(2) 商数关系 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$,

(3) 平方关系 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, 1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha, 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$

证明：(1)(2)由定义直接得到

$$(3) \text{ 由 } x^2 + y^2 = r^2 \text{ 得 } \left(\frac{x}{r}\right)^2 + \left(\frac{y}{r}\right)^2 = 1, 1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2 = \left(\frac{r}{x}\right)^2, 1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2 = \left(\frac{r}{y}\right)^2,$$

$$\text{于是 } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, 1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha, 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

3、诱导公式：

(1) 终边在横轴的角加减 a 的三角函数等于 a 的同名三角函数添符号

如： $\sin(kp \pm a) = \pm \sin a$ (k 是整数)，正负号的确定：把 a 当成锐角，看 $kp \pm a$ 所在的象限而定。

证明：取 a 终边上的一点 $P(x, y)$ ，

1° 因角 $p+a$ 与 a 终边关于原点对称，

则 $P_1(-x, -y)$ 在 $p+a$ 的终边上，且 $|OP|=|OP_1|$

因此 $\sin(p+a) = -\sin a, \cos(p+a) = -\cos a, \tan(p+a) = \tan a$

2° 因角 $p-a$ 与 a 终边关于 y 轴对称，则 $P_2(-x, y)$ 在 $p-a$ 的终边上，且 $|OP|=|OP_2|$

因此 $\sin(p-a) = \sin a, \cos(p-a) = -\cos a, \tan(p-a) = -\tan a$

3° 因角 $-a$ 与 a 终边关于 x 轴对称，则 $P_3(x, -y)$ 在 $p-a$ 的终边上，且 $|OP|=|OP_3|$

因此 $\sin(-a) = -\sin a, \cos(-a) = \cos a, \tan(-a) = -\tan a$

4° $2kp+a$ 与 a 终边相同，于是

$\sin(2kp+a) = \sin a, \cos(2kp+a) = \cos a, \tan(2kp+a) = \tan a$

综上，终边在横轴的角加减 a 的三角函数等于 a 的同名三角函数添符号

(2) 终边在纵轴的角加减 a 的三角函数等于 a 的余函数添符号
(注: 正弦与余弦, 正切与余切, 正割与余割, 都是互为余函数)

$$\text{如: } \sin(kp + \frac{p}{2} \pm a) = \cos a \text{ 添符号, } k \text{ 是整数}$$

证明: 取 a 终边上的一点 $P(x, y)$

1° 因角 $\frac{p}{2} - a$ 与 a 终边关于直线 $y = x$ 对称,

则 $P_1(y, x)$ 在 $\frac{p}{2} - a$ 的终边上, 且 $|OP| = |OP_1|$

$$\text{因此 } \sin(\frac{p}{2} - a) = \cos a, \cos(\frac{p}{2} - a) = \sin a, \tan(\frac{p}{2} - a) = \cot a$$

2° 因角 $\frac{p}{2} + a$ 是 a 逆时针旋转 $\frac{p}{2}$ 而得, 则 $P_2(-y, x)$ 在 $\frac{p}{2} + a$ 的终边上, 且 $|OP| = |OP_2|$

$$\text{因此 } \sin(\frac{p}{2} + a) = \cos a, \cos(\frac{p}{2} + a) = -\sin a, \tan(\frac{p}{2} + a) = -\cot a$$

3° 因为 $\sin(kp + \frac{p}{2} \pm a) = \sin(\frac{p}{2} \pm a)$ 添符号, 所以 $\sin(kp + \frac{p}{2} \pm a) = \cos a$ 添符号

其它的类似

综上, 终边在纵轴的角加减 a 的三角函数等于 a 的余函数添符号

注: 正弦与余弦, 正切与余切, 正割与余割互为余函数

口诀: 纵变横不变, 符号看象限。

4、和差角公式

$$(1) \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \quad (2) \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$(3) \cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad (4) \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$(5) \tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad (5) \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

证明: 先证(4) $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

因为 a, b 的终边与单位圆的交点分别 $A(\cos a, \sin a), B(\cos b, \sin b)$

1° 当 $0 \leq a - b \leq p$ 时, 则 $a - b$ 是向量 OA 与 OB 的夹角, 于是

$$\cos(a - b) = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|OA||OB|} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

2° 当 $p < a - b < 2p$ 时, 向量 OA 与 OB 的夹角为 $2p - (a - b)$

$$\text{于是 } \cos(a - b) = \cos[2p - (a - b)] = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|OA||OB|} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

3° 当 $a - b \notin [0, 2p]$ 时, 必存在整数 k 使得, $2kp + a - b \in [0, 2p)$ 于是结论也成立

综上, 公式(4)成立

$$\begin{aligned} \text{证(3): } & \cos(a+b) = \cos[a - (-b)] = \cos a \cos(-b) - \sin a \sin(-b) \\ & = \cos a \cos b + \sin a \sin b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{证(1): } & \sin(a+b) = \sin[(\frac{p}{2}-a)-b] = \cos(\frac{p}{2}-a)\cos b + \sin(\frac{p}{2}-a)\sin b \\ & = \sin a \cos b + \cos a \sin b \end{aligned}$$

证(2)与证(3)类似

$$\text{证(5): } \tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin a \cos b + \cos a \sin b}{\cos a \cos b - \sin a \sin b} = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

证(6)与证(3)类似

5、倍角公式

$$(1) \sin 2a = 2 \sin a \cos a = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a}$$

$$(2) \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$$

$$(3) \tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

注: 只要在和角公式中令 $b = a$ 就可得上面的公式

$$6、\text{降次公式} (1) \cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \quad (2) \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$$

注: 这是倍角余弦公式的变形

7、半角公式

$$(1) \cos \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos a}{2}}$$

$$(2) \sin \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{2}}$$

$$(3) \tan \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{1 + \cos a}}$$

$$(4) \tan \frac{a}{2} = \frac{\sin a}{1 + \cos a} = \frac{1 - \cos a}{\sin a}$$

$$\text{证明 (4)} \tan \frac{a}{2} = \frac{\sin \frac{a}{2}}{\cos \frac{a}{2}} = \frac{\frac{2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2}}{2}}{\frac{2 \cos^2 \frac{a}{2}}{2}} = \frac{\sin a}{1 + \cos a}$$

$$\tan \frac{a}{2} = \frac{\sin \frac{a}{2}}{\cos \frac{a}{2}} = \frac{\frac{2 \sin^2 \frac{a}{2}}{2}}{\frac{2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2}}{2}} = \frac{1 - \cos a}{\sin a}$$

8、万能公式

$$(1) \sin a = \frac{2 \tan \frac{a}{2}}{1 + \tan^2 \frac{a}{2}} \quad (2) \cos a = \frac{1 - \tan^2 \frac{a}{2}}{1 + \tan^2 \frac{a}{2}} \quad (3) \tan a = \frac{2 \tan \frac{a}{2}}{1 - \tan^2 \frac{a}{2}}$$

证明: (1) $\sin a = \frac{2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2}}{\sin^2 \frac{a}{2} + \cos^2 \frac{a}{2}} = \frac{2 \tan \frac{a}{2}}{1 + \tan^2 \frac{a}{2}}$

$$(2) \cos a = \frac{\cos^2 \frac{a}{2} - \sin^2 \frac{a}{2}}{\sin^2 \frac{a}{2} + \cos^2 \frac{a}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{a}{2}}{1 + \tan^2 \frac{a}{2}}$$

9、积化和差

$$(1) \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)] \quad (2) \cos a \sin b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)] \\ (3) \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)] \quad (4) \sin a \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)]$$

证明: (1)(2)

$$\text{由 } \sin a \cos b + \cos a \sin b = \sin(a+b) \quad \sin a \cos b - \cos a \sin b = \sin(a-b)$$

相加再除以 2 得: $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$

相减再除以 2 得: $\cos a \sin b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$

(3)(4)

$$\text{由 } \cos a \cos b - \sin a \sin b = \cos(a+b)$$

$$\cos a \cos b + \sin a \sin b = \cos(a-b)$$

相加再除以 2 得: $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$

相减再除以 2 得: $\sin a \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)]$

10、和差化积

$$(1) \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \quad (2) \sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$(3) \cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \quad (4) \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

证明: (1) 在 $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2 \sin a \cos b$ 中, 令 $a+b=x, a-b=y$ 得

$$a = \frac{x+y}{2}, b = \frac{x-y}{2}, \text{ 代入原式得 } \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

(2)(3)(4) 分别由

$$\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2 \cos a \sin b,$$

$$\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2 \cos a \cos b$$

$$\cos(a+b) - \cos(a-b) = -2 \sin a \sin b \text{ 作与(1)一样的代换可得}$$